ワクチン		種別	接種方法	初回	1週間	2週間	3週間	4週間	6週間	8週間	3か月	6か月	12か月～
二種混合ワクチン【DT, DTビック】（ジフテリア・破傷風）		国内	皮下	○									
成人用三種混合ワクチン（Tdap）		輸入	筋注	○									
麻疹・風疹二種混合ワクチン【MR】（麻しん・風しん）		国内	皮下	○				(○)					
日本脳炎ワクチン		国内	皮下	○	(○)							(○)	
		備考	3回接種で4年間有効。1960年以降に生まれた方は2回接種で有効。										
おたふくかぜワクチン（流行性耳下腺炎）		国内	皮下	○				(○)					
		備考	麻しん、風しん、水痘、おたふく（流行性耳下腺炎）ワクチンは接種歴が 1 回あれば 1 回の追加接種で終了										
水痘ワクチン（ビケン水痘ワクチン）		国内	皮下	○				(○)					
髄膜炎4価結合型ワクチン（メンクアドフィ）		国内	筋注	○									
急性灰白髄炎（ポリオ）ワクチン（イモバックスポリオ）		国内	皮下	○									
帯状疱疹ワクチン	シングリックス	国内	筋注	○						(○)			
	ビケン	国内	皮下	○									
肺炎球菌ワクチン（ニューモバックスNP）		国内	皮下	○									
破傷風ワクチン		国内	皮下	○			○						○
		備考	3回接種で10年間有効。1969年以降に生まれた方は3回接種の必要なし。										
A型肝炎ワクチン	エイムゲン	国内	皮下/筋注	○		○						○	
	HAVRIX	輸入	筋注	○								(○)	
		備考	【国内】2回接種で約1年間有効。3回接種で約10年間有効 【輸入】1回接種で1～3年間、2回接種（6～12か月後）で約20年間有効										
B型肝炎ワクチン	ビームゲン、ヘプタバックス	国内	皮下/筋注	○				○				○	
		備考	3回接種後1ヵ月～1年以内に抗体チェックを推奨。										
腸チフスワクチン（Typhim Vi）		輸入	皮下/筋注	○									
		備考	1回接種で約3年間有効。										
狂犬病ワクチン（曝露前予防）	ラビピュール筋注	国内	筋注	○	○		(○)						
	Verorab	輸入	筋注	○	○								
ダニ脳炎ワクチン（FSME）		国内	筋注	○				(○)				(○)	
髄膜炎4価結合型ワクチン（Menveo、Nimenrix）		輸入	筋注	○									